



IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

## — CADERNO DE PROVA —

Este **Caderno de Prova** deve conter um conjunto de páginas numeradas sequencialmente, contendo 35 questões de **Análise Quantitativa e Lógica**. Você está recebendo também um **Cartão de Respostas**, no qual deverá marcar as alternativas que escolher para as questões.

### Verifique se:

- este caderno está **completo**, com todas questões de 1 a 35;
- o Cartão de Respostas que você recebeu está devidamente identificado com o **seu nome**;
- o **modelo de prova** indicado acima corresponde ao modelo indicado no Cartão de Respostas.

### Instruções:


- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão de Respostas**, a alternativa que mais adequadamente a responda. Cada questão tem uma única alternativa correta.
- Assine no espaço indicado no **Cartão de Respostas**.
- O **Cartão de Respostas** não pode ser rasgado, dobrado, amassado ou rasurado, nem conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- Destaque **cuidadosamente** o **Cartão de Respostas** do caderno de prova, utilizando a serrilha indicada. Lembre-se de que o **Cartão de Respostas** não será substituído em hipótese alguma.
- Use lápis 2B ou caneta com tinta preta ou azul.
- Em hipótese alguma utilize caneta com tinta vermelha, laranja ou roxa.
- Marque apenas uma opção por questão.
- O computador não registrará marcação de resposta onde houver falta de nitidez ou mais de uma alternativa assinalada em uma mesma questão.
- Se houver necessidade de apagar a resposta, faça com o máximo de cautela, evitando deixar sombras.
- Não é permitido destacar qualquer folha deste caderno, com exceção do Cartão de Respostas.
- Se você precisar de algum esclarecimento, solicite-o ao **Monitor**.
- Você dispõe de **três horas** para fazer esta prova, **incluindo o tempo para preencher o Cartão de Respostas**.

BOA PROVA!

*Coordenação Executiva de Processos Seletivos*

### ■ QUESTÃO 01

Quinze bolas esféricas idênticas de bilhar estão perfeitamente encostadas entre si, e presas por uma fita totalmente esticada. A figura mostra as bolas e a fita, em vista superior.



A medida do raio de uma dessas bolas de bilhar, em centímetros, é igual a

- (a)  $4\sqrt{3} - 2$ .
- (b)  $2\sqrt{3} + 1$ .
- (c)  $3\sqrt{3} - 1$ .
- (d)  $3\sqrt{3} - 2$ .
- (e)  $2\sqrt{3} - 1$ .

### ■ QUESTÃO 02

Em um grupo de 2000 pessoas, 70,0% possuem geladeira, 85,0% possuem aparelho celular e 45,2% possuem automóvel. O menor número possível de pessoas desse grupo que possuem geladeira, aparelho celular e automóvel é igual a

- (a) 4.
- (b) 6.
- (c) 8.
- (d) 10.
- (e) 12.

### ■ QUESTÃO 03

Na reunião de planejamento estratégico de uma empresa, na qual compareceram 30 pessoas, nem todos os participantes se cumprimentaram. Se cada um dos homens cumprimentou apenas 6 mulheres e cada uma das mulheres cumprimentou apenas 4 homens, podemos concluir que o número de mulheres presentes foi

- (a) 20
- (b) 18
- (c) 16
- (d) 14
- (e) 12

### Texto para as questões de 04 a 05.

Matrizes de Vandermonde são matrizes quadradas em que os elementos ao longo de cada linha formam progressões geométricas de primeiro termo igual a 1, não necessariamente com a mesma razão para cada linha.

Por exemplo, a matriz  $B$  a seguir, de ordem 4, é de Vandermonde:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 25 & 125 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & -3 & 9 & -27 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \end{bmatrix}$$

Seja  $V$  uma matriz de Vandermonde de ordem 3 em que a PG formada com os elementos da 1ª linha tem razão 2, a PG formada com os elementos da 2ª linha tem razão 3 e a PG formada com os elementos da 3ª linha tem razão  $-2$ .

### ■ QUESTÃO 04

O determinante da matriz  $V$  é igual a

- (a)  $-16$ .
- (b) 0.
- (c) 16.
- (d) 20.
- (e) 36.

### ■ QUESTÃO 05

Considere a matriz  $X$ , do tipo  $3 \times 1$ , tal que

$$V \cdot X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix},$$

sendo  $a$ ,  $b$  e  $c$  constantes reais.

O valor do elemento que ocupa a 2ª linha de  $X$  é necessariamente igual a


- (a) 1.
- (b)  $\frac{a+c}{2}$ .
- (c) 0.
- (d)  $\frac{a-c}{4}$ .
- (e)  $b + c$ .

Texto para as questões de 06 a 07.

A figura ao lado representa os gráficos das funções

- $f(x) = \sin(x)$ ,
- $g(x) = \cos(x)$ ,
- $h(x) = \cos(2x)$ ,

definidas no intervalo  $[0, 2\pi]$ .



#### ■ QUESTÃO 06

O valor máximo da função  $d(x) = h(x) - g(x)$  é

- 0,5.
- 0.
- 1.
- 1,5.
- 2.

#### ■ QUESTÃO 07

Sorteando-se aleatoriamente um número real  $x$  do intervalo  $[0, 2\pi]$ , a probabilidade de que ele satisfaça a desigualdade  $\cos(x) \leq \sin(x) \leq \cos(2x)$  é igual a

- $\frac{1}{6}$ .
- $\frac{4}{25}$ .
- $\frac{5}{24}$ .
- $\frac{1}{4}$ .
- $\frac{9}{25}$ .

Texto para as questões de 08 a 09.

Sejam  $x$  e  $y$  dois números reais positivos. Definimos as seguintes médias:

- média aritmética, denotada por  $MA(x, y)$ , calculada como a metade da soma entre  $x$  e  $y$ ;
- média geométrica, denotada por  $MG(x, y)$ , calculada como a raiz quadrada do produto entre  $x$  e  $y$ ;
- média harmônica, denotada por  $MH(x, y)$ , calculada como o inverso da média aritmética entre os inversos de  $x$  e  $y$ ;

#### ■ QUESTÃO 08

Em um concurso público, o critério de classificação é obter nota final maior ou igual a 10, em uma escala de 0 a 16. A nota final é calculada como a média **geométrica** entre duas notas: a da prova de conhecimentos gerais e a da prova de conhecimentos específicos, ambas na mesma escala de 0 a 16.

As provas são aplicadas em dias diferentes, sendo a primeira de conhecimentos gerais. De acordo com o critério descrito, existe uma nota mínima a ser atingida nessa prova, caso contrário o candidato estará automaticamente desclassificado, independentemente da nota que venha a tirar na prova de conhecimentos específicos. O valor dessa nota mínima é

- 0.
- 5,75.
- 6,00.
- 6,25.
- 10,00.


#### ■ QUESTÃO 09

Sejam  $a$  e  $b$  dois números reais e positivos tais que  $MH(a, b) = A$ . O valor de  $a$  em função de  $b$  e a condição que se deve impor sobre o valor de  $b$  para que isso aconteça são, respectivamente,

- $\frac{Ab}{2b-A}$  e  $b > \frac{A}{2}$ .
- $\frac{Ab}{2b-A}$  e  $b < \frac{A}{2}$ .
- $\frac{A}{2}$  e  $b > \frac{1}{A}$ .
- $\frac{A}{2}$  e  $b < \frac{1}{A}$ .
- $a = 2A - b$  e  $b > 0$ .


**Texto para as questões de 10 a 11.**

Um fabricante de enfeites de festas infantis produz uma peça decorativa usando 14 esferas idênticas de isopor, todas de raio medindo  $R$ . Para isso, o primeiro passo da fabricação é dispor sobre uma superfície plana 9 dessas esferas, sendo a vista superior dessa disposição exibida na figura a seguir.



O quadrilátero tracejado exibido na figura anterior é um quadrado. Note que duas das esferas,  $E1$  e  $E2$ , foram destacadas.


O próximo passo é dispor outras 4 esferas apoiadas sobre as da base de modo que cada uma tangencie 4 das esferas da base e 2 das esferas da 2ª camada. A vista superior após a execução desse passo é exibida na figura a seguir.



Por fim, a última esfera, denotada por  $E3$ , é colocada sobre a 2ª camada de modo a tangenciar todas as suas esferas, conforme vista superior exibida na figura a seguir.




O resultado final está esquematizado em perspectiva na figura a seguir, sendo destacadas as esferas  $E1$ ,  $E2$  e  $E3$  mencionadas nos passos anteriores.




**■ QUESTÃO 10**

Considere uma seção plana que passe pelos centros das esferas  $E1$ ,  $E2$  e  $E3$ . A alternativa que melhor representa essa seção é


(a)




(b)




(c)



(d)



(e)



**■ QUESTÃO 11**

O produto final é acomodado em caixas com o formato de cilindro reto de altura  $6R$  e de modo que a superfície lateral da caixa tangencie quatro das esferas da base. Assim, apenas uma parte da capacidade da caixa é efetivamente ocupada por isopor. A razão entre a capacidade da caixa e o volume ocupado pelo isopor é

(a)  $\frac{2(9-4\sqrt{2})}{441}$ .

(b)  $\frac{9(9+4\sqrt{2})}{2}$ .






(c)  $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ .

(d)  $\frac{4(9-4\sqrt{2})}{63}$ .

(e)  $\frac{9(9+4\sqrt{2})}{28}$ .

■ QUESTÃO 12

Após a administração de um antibiótico, a população de bactérias causadoras de uma infecção passa a diminuir a uma taxa de 10% por hora. Se a população inicial de bactérias é dada por  $B_0$ , o gráfico que melhor representa  $t$ , o tempo decorrido em horas após a administração do antibiótico, em função de  $B$ , o número de bactérias ainda presentes na infecção, é



**Texto para as questões de 13 a 14.**

Uma máquina cortadora a laser é capaz de executar duas funções: cortar e gravar. Cortar significa aplicar o laser com intensidade e por tempo suficientes para que a placa de material seja atravessada; gravar significa aplicar o laser brevemente sobre o material, de modo que sua superfície seja levemente queimada e assuma coloração mais escura que a do material.


Uma gráfica oferece os serviços dessa máquina a seus clientes, cobrando da seguinte forma:

- R\$ 0,20 por  $cm^2$  de gravação
- R\$ 0,50 por  $cm$  de corte

O material fica por conta do cliente, que deve levar a placa em tamanho compatível com a cortadora.

**■ QUESTÃO 13**

A dona de uma sorveteria decidiu fazer um enfeite no formato de um picolé, como mostra a figura a seguir.



Sabe-se que:

- $\widehat{ABC}$  é um arco de circunferência de diâmetro  $\overline{AC}$ ;
- $ACDI$  é um retângulo tal que  $DI = 10\text{ cm}$  e  $AI = 15\text{ cm}$ ;
- $EFGH$  é um retângulo tal que o lado  $\overline{HE}$  está contido no segmento  $\overline{DI}$  e os pontos médios de  $\overline{HE}$  e  $\overline{DI}$  coincidem.
- $HE = 2\text{ cm}$  e  $HG = 10\text{ cm}$ .

Para obter tal enfeite, a máquina precisou executar serviços tanto de corte, quanto de gravação. A partir da placa de madeira que a dona da sorveteria levou, cortou-se o contorno da figura (que exclui o segmento  $\overline{HE}$ ) e gravou-se a região destacada em cinza.

Considerando-se  $\pi = 3$ , o valor cobrado para executar tal serviço deve ser igual a

- (a) R\$ 20,00.
- (b) R\$ 35,00.
- (c) R\$ 37,50.
- (d) R\$ 75,00.
- (e) R\$ 77,00.

**■ QUESTÃO 14**

Um cliente deseja executar um serviço que envolve tanto corte, quanto gravação. Para isso, coloca a figura em um plano cartesiano e escreve equações e inequações que a descrevem.

O contorno que será cortado é dado pelas seguintes equações:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= 4, \text{ com } x \in [-2,2] \text{ e } y \geq 0 \\ y &= -x - 2, \text{ com } x \in [-2,0] \\ y &= x - 2, \text{ com } x \in [0,2] \end{aligned}$$

Já a região gravada é descrita pelas seguintes inequações:


$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &\leq 1, \text{ com } x \geq 0 \text{ e } y \geq 0 \\ 1 \leq x^2 + y^2 &\leq 4, \text{ com } x \leq 0 \text{ e } y \geq 0 \end{aligned}$$

Dentre as alternativas a seguir, a que melhor representa o serviço executado é

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)

**Texto para as questões de 15 a 16.**

A figura a seguir exibe um trecho do gráfico da função  $f$  cuja lei é  $f(x) = x^3$ .

**■ QUESTÃO 15**

Uma mercadoria teve seu valor reajustado, sofrendo um desconto de 20%. Um mês após esse desconto, ela sofreu um aumento de 20% e, após outro mês, outro aumento de 25%.

Caso os reajustes fossem todos de mesmo valor percentual, para que o efeito final sobre o preço da mercadoria fosse o mesmo, seriam necessários três

- (a) aumentos de, aproximadamente, 20%.
- (b) aumentos de, aproximadamente, 14%.
- (c) aumentos de, aproximadamente, 6%.
- (d) descontos de, aproximadamente, 14%.
- (e) descontos de, aproximadamente, 5%.

**■ QUESTÃO 16**

Um veículo, após ser retirado da concessionária, passa a sofrer uma desvalorização de 5% ao ano. Dessa forma, 9 anos após a saída da concessionária, a desvalorização total do veículo terá sido de, aproximadamente,

- (a) 50%
- (b) 40%
- (c) 30%
- (d) 20%
- (e) 10%

**Texto para as questões de 17 a 18.**

Ao longo de um ano, a taxa de câmbio de uma moeda  $X$  em relação a uma moeda  $Y$  foi dada pela seguinte função:

$$f(t) = 1,625 + 1,25 \cdot \cos\left(\pi \cdot \frac{(t-3)}{12}\right)$$

sendo  $t$  o tempo, dado em meses desde o início do ano. Assim,  $t = 9$  indica a taxa no início de outubro, que era de 1,625 unidades da moeda  $X$  para uma unidade da moeda  $Y$  (note que esse valor da taxa indica que no instante considerado a moeda  $X$  era “menos valiosa” que a moeda  $Y$ ).

**■ QUESTÃO 17**

Houve um intervalo de tempo ao longo do ano considerado em que a moeda  $X$  deixou de ser “menos valiosa” que a moeda  $Y$ . Esse intervalo teve duração de

- (a) 5 meses.
- (b) 4 meses.
- (c) 3 meses.
- (d) 2 meses.
- (e) 1 mês.

**■ QUESTÃO 18**

Ao longo do ano analisado, a maior taxa de câmbio da moeda  $X$  em relação à moeda  $Y$  atingida e o instante em que isso ocorreu foram, respectivamente,

- (a) 2,625 e início de janeiro.
- (b) 2,625 e início de março.
- (c) 2,875 e início de janeiro.
- (d) 2,875 e início de abril.
- (e) 2,875 e início de junho.

**Texto para as questões de 19 a 20.**

Em uma disciplina de um curso de Economia, os critérios para que o aluno seja aprovado são da seguinte forma: em vez de atingir uma média mínima ao longo do curso, o aluno deve atingir requisitos mínimos em cada uma das 2 provas. Dependendo da nota obtida na prova, o aluno estará aprovado, reprovado ou condicionalmente aprovado (em relação àquela prova).

Os critérios de nota são os seguintes:

- O aluno faz a 1ª prova, obtendo uma nota  $P1$ :
  - se  $P1 < 2$ , o aluno estará instantaneamente reprovado, e não poderá continuar o curso;
  - se  $2 \leq P1 < 5$ , o aluno deverá fazer uma avaliação suplementar, obtendo uma nota  $AS1$ ;
    - se  $AS1 < 7$ , o aluno estará instantaneamente reprovado, e não poderá continuar o curso;
    - se  $AS1 \geq 7$ , o aluno é condicionalmente aprovado na 1ª prova.
  - se  $P1 \geq 5$ , o aluno é aprovado na 1ª prova.
- Para os alunos que foram aprovados (condicionalmente ou não) na 1ª prova, é aplicada uma 2ª prova, na qual eles obtêm uma nota  $P2$ :
  - se  $P2 < 2$ , o aluno estará instantaneamente reprovado, e não poderá continuar o curso;
  - se  $2 \leq P2 < 5$ , o aluno deverá fazer uma avaliação suplementar, obtendo uma nota  $AS2$ ;
    - se  $AS2 < 7$ , o aluno estará instantaneamente reprovado, e não poderá continuar o curso;
    - se  $AS2 \geq 7$ , o aluno é condicionalmente aprovado na 2ª prova.
  - se  $P2 \geq 5$ , o aluno é aprovado na 2ª prova.

Se o aluno for condicionalmente aprovado em ambas as provas, ele estará reprovado no curso. Se for condicionalmente aprovado em apenas uma delas, será avaliada a frequência: caso o aluno tenha comparecido a menos de 70% das aulas, estará reprovado, sendo aprovado no caso contrário. Por fim, se o aluno for aprovado em ambas, ele estará aprovado no curso, sem análise da frequência.

**■ QUESTÃO 19**

Um aluno tirou nota  $P1 = 4,8$  e fez a 2ª prova. Quanto à sua frequência, sabendo-se que ele foi aprovado no curso, é necessariamente verdadeiro que o aluno

- (a) compareceu a pelo menos 70% das aulas.
- (b) compareceu a mais de 70% das aulas.
- (c) faltou em pelo menos 30% das aulas.
- (d) faltou em mais de 30% das aulas.
- (e) não teve sua frequência analisada.

**■ QUESTÃO 20**

Sabe-se que um aluno com 80% de frequência e que fez a 2ª prova foi reprovado no curso. Quanto às suas notas  $P1$  e  $P2$ , pode-se concluir que, certamente, o aluno obteve

- (a)  $P1 < 5$  e  $P2 < 5$ .
- (b)  $P1 \geq 5$  e  $P2 < 2$ .
- (c)  $P1$  qualquer e  $P2 < 2$ .
- (d)  $P1 < 5$  e  $P2 < 2$ .
- (e)  $P1 \geq 2$  e  $P2 < 5$ .

**■ QUESTÃO 21**

Considere as seguintes proposições:

“Quem espera sempre alcança”  
“Esperar é uma virtude de todo sábio”

Se ambas as proposições forem verdadeiras, pode-se concluir que


- (a) quem não é sábio, nunca alcança.
- (b) quem espera é sábio.
- (c) os sábios sempre alcançam.
- (d) quem alcança é sábio.
- (e) mesmo sendo sábio, não se alcança.



Texto para as questões de 22 a 23.

A figura ao lado exibe os gráficos das funções  $f$  e  $g$ , ambas de domínio  $]0, 2\pi]$ , cujas leis são, respectivamente:

- $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin x$
- e  $g(x) = \log_2 x$ .



■ QUESTÃO 22

A figura que melhor representa o gráfico da função  $m$ , cuja lei é  $m(x) = 2 \cdot f(2x) - 2$ , é

(a)

(c)

(e)

(b)

(d)

■ QUESTÃO 23

A figura que melhor representa o gráfico da função  $h$ , cuja lei é  $h(x) = g(f(x))$ , é

(a)


(c)


(e)

(b)

(d)

■ QUESTÃO 24

A pavimentação indicada na fotografia possui simetria rotacional de  $90^\circ$  e é formada por quadrados, círculos e figuras com a forma . Em relação ao desenho feito sobre a fotografia, sabe-se que A, B, C e D são centros dos círculos, e que  $BM = MN = 1\text{ m}$ .



Fotografia da calçada do Palácio Galveias, em Lisboa, Portugal.

Em um plano totalmente recoberto por reproduções completas do quadrado ABCD indicado na figura, a razão entre a área preenchida com ladrilhos pretos e a área preenchida com ladrilhos brancos é igual a

- (a)  $\frac{10-\pi}{4+\pi}$ .
- (b)  $\frac{14-\pi}{4+\pi}$ .
- (c)  $\frac{10+\pi}{4-\pi}$ .
- (d)  $\frac{14+\pi}{4-\pi}$ .
- (e)  $\frac{10-\pi}{4-\pi}$ .

■ QUESTÃO 25

Se  $x^2 + y^2 + z^2 = xy + xz + yz = 6$ , então um possível valor para a soma  $x + y + z$  é

- (a)  $\sqrt{6}$ .
- (b)  $2\sqrt{2}$ .
- (c)  $2\sqrt{3}$ .
- (d)  $3\sqrt{2}$ .
- (e)  $3\sqrt{3}$ .


■ QUESTÃO 26

Quatro moedas de 25 centavos e quatro de 50 centavos são misturadas ao acaso e colocadas em uma fila. A probabilidade de que a primeira e a última moeda dessa fila sejam de 50 centavos é igual a

- (a)  $\frac{2}{7}$ .
- (b)  $\frac{7}{25}$ .
- (c)  $\frac{3}{14}$ .
- (d)  $\frac{1}{5}$ .
- (e)  $\frac{9}{5}$ .

■ QUESTÃO 27

Um tanque, inicialmente vazio, tem a forma de prisma triangular regular e suas paredes têm espessuras desprezíveis. Após algum tempo despejando água no tanque, um cano de vazão  $3\sqrt{3}\text{ m}^3$  por minuto o encheu parcialmente, tendo a água ocupado o espaço de um prisma triangular regular, conforme indicado na figura.



Funcionando na mesma vazão, o tempo necessário para que o cano acabe de encher o tanque é de 5 minutos e t segundos, sendo que t é um número no intervalo

- (a) [1, 12].
- (b) [13, 24].
- (c) [25, 36].
- (d) [37, 48].
- (e) [49, 59].

■ QUESTÃO 28

É possível demonstrar que o polinômio  $P(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{2}$  é uma boa aproximação da função  $f(x) = e^x$  para valores de  $x$  próximos de zero. Usando essa informação, o valor aproximado de  $\sqrt[10]{e}$  é

- (a) 1,105.
- (b) 1,061.
- (c) 0,781.
- (d) 0,610.
- (e) 0,553.

**■ QUESTÃO 29**

Um paralelepípedo reto-retângulo de arestas medindo 3, 4 e 5 está representado no sistema ortogonal  $xyz$ , como mostra a figura.

Considere cada ponto desse sistema como uma terna  $(x, y, z)$ , representada matricialmente por

meio do vetor coluna  $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ .


Sendo assim, a solução da equação matricial

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 1 \\ 2,5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

representa, nesse

sistema de eixos, um ponto pertencente à

- (a) região interior ao paralelepípedo.
- (b) região exterior ao paralelepípedo.
- (c) face ABFE do paralelepípedo.
- (d) face CBGF do paralelepípedo.
- (e) face DCGH do paralelepípedo.



**■ QUESTÃO 30**

Em um torneio de xadrez disputado por sete mulheres, cada uma joga com cada uma das outras uma única vez. Em cada partida, a ganhadora acumula 2 pontos, a perdedora acumula zero ponto e, em caso de empate, cada jogadora acumula 1 ponto. A tabela a seguir indica todos os resultados do torneio, exceto o resultado da última partida, entre Elisa e Fernanda, que ainda não foi disputada.

Nome	Partidas jogadas	Partidas ganhas	Partidas empatadas	Partidas perdidas	Pontos acumulados
Ana	6	6	0	0	12
Bianca	6	5	0	1	10
Camila	6	3	1	2	7
Daniela	6	2	0	4	4
Elisa	5	1	2	2	4
Fernanda	5	1	0	4	2
Gabriela	6	0	1	5	1

A partida ganha por Elisa, que está indicada na tabela, foi sobre

- (a) Gabriela.
- (b) Daniela.
- (c) Camila.
- (d) Bianca.
- (e) Ana.

**■ QUESTÃO 31**

Cada lado do polígono indicado na figura mede 10 cm e seus ângulos internos têm medidas de  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $135^\circ$  e  $270^\circ$ , como mostra a figura. A área desse polígono, em  $\text{cm}^2$ , é igual a

- (a)  $500\sqrt{2}$ .
- (b)  $450\sqrt{2}$ .
- (c)  $400\sqrt{2}$ .
- (d)  $350\sqrt{2}$ .
- (e)  $300\sqrt{2}$ .



**■ QUESTÃO 32**

O número de pares ordenados  $(x, y)$  tais que  $x$  e  $y$  pertençam ao conjunto  $\{1, 3, 5, 7, \dots, 1999\}$ , com  $x > y$ , é igual a


- (a) 999000.
- (b) 499450.
- (c) 499500.
- (d) 249750.
- (e) 249724.

**■ QUESTÃO 33**

No plano cartesiano ortogonal de origem  $O(0, 0)$  estão representadas:

- uma circunferência  $\lambda$ , tangente à reta  $r$  em  $T$  e ao eixo das ordenadas;
- o triângulo retângulo  $OAT$ , com  $A(6, 0)$  e um ângulo externo de medida  $120^\circ$ .

Sabe-se, ainda, que  $r$  passa pela origem do plano.



Nas condições dadas, o raio de  $\lambda$  tem medida igual a

- (a)  $\frac{5}{2}$ .
- (b)  $2\sqrt{2}$ .
- (c) 3.
- (d)  $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ .
- (e)  $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ .

**■ QUESTÃO 34**

Das afirmações a seguir, apenas uma é falsa.


- i. André é mais velho do que Bruno;
- ii. Cláudio é mais novo do que Bruno;
- iii. A soma das idades de Bruno e Cláudio é igual ao dobro da idade de André;
- iv. Cláudio é mais velho do que André.
- v. Diego tem um ano a menos do que André.

Se todas as idades são números inteiros e duas pessoas não têm a mesma idade, então, necessariamente,

- (a) André é o mais velho dos quatro.
- (b) Bruno é o mais novo dos quatro.
- (c) Diego é o mais novo dos quatro.
- (d) Bruno é mais velho do que Cláudio.
- (e) Bruno é mais velho do que Diego.

**■ QUESTÃO 35**

Em uma malha, formada por quadrados de lado medindo  $1\text{ cm}$ , foram traçados dois segmentos paralelos, tendo um deles 7 pontos em destaque, e o outro 6, conforme indica a figura.



Um quadrilátero deve ser desenhado sobre essa malha de maneira que tenha os quatro vértices dentre os 13 pontos destacados dos segmentos. O quadrilátero deverá ter apenas um par de lados paralelos, e área igual a  $12\text{ cm}^2$ . O total de quadriláteros diferentes que podem ser desenhados atendendo às condições estabelecidas é igual a

- (a) 19.
- (b) 22.
- (c) 29.
- (d) 32.
- (e) 33.